

OMBRE™


Calibrachoa hybrida



BRAND
NEW 23



OMBRE™ Sunrise



- Une gamme de couleurs sur chaque plante
- Vigueur moyenne et port semi-trainant contrôlé
- Fleurit suffisamment tôt pour tout type de marché
- Testée pour sa sensibilité au pH
- Hauteur et largeur à maturité: 30cm x 36cm

Variétés dans la série OMBRE™:



OMBRE™ Blue



OMBRE™ Blush



OMBRE™ Pink



OMBRE™ Yellow

Pour des informations supplémentaires sur la culture technique:

OMBRE™ [CLIQUEZ ICI](#)



 **DANZIGER**

www.danzigeronline.com |   

OMBRE™

Calibrachoa hybrida



CONSEILS DE MULTIPLICATION



Période de floraison

**Printemps / Été
Floraison**



Largeur

30 - 36 cm



Hauteur

30 - 36 cm

Temps moyen	Température	Hormone	Fertilisation	Fongicide
5 semaines	Semaines 1 - 2 21 ° - 22 °C	Facultatif	Semaines 1-2 50 ppm N	Pulvériser un fongicide pour lutter contre Le Botrytis et les bactéries le jour du piquage
	Semaines 3 - 5 18 ° - 20 °C		Semaines 3 - 5 100 à 150 ppm N	Jour du piquage et semaine 2



Spécifications de l'irrigation - Retirer la brumisation dès que possible (jour 2 ou 3).



L'application de K-IBA peut accélérer l'enracinement. Eclairer dans la reproduction pour une croissance optimale et pour accélérer le temps de culture. Daminozide à 1200 à 1500 ppm le jour du piquage. Mélange en réservoir Daminozide plus Uniconazole-P semaine 3 pour contrôler l'étirement si nécessaire.

Enracinement	pH	EC	Temp	Engrais	Eclairage	PGR	Fongicide	Commentaires
Semaine 1	5,2 / 5,8	0,80	22° / 23° C	50 ppm N en brumisation			Jour du piquage	Engrais par brumisation
Semaine 2	5,2 à 5,8	0,80 à 0,90	22° / 23° C	50 ppm N en brumisation			Seconde application fongicide	
Semaine 3	5,2 à 5,8	0,90 à 1,0	Refroidir à 21° - 20 °C	Engrais 100 ppm à 150 ppm		Daminozide si nécessaire		
Semaine 4	5,2 à 5,8	1,0 à 1,2	18 ° à 20 °C	Engrais 100 ppm à 150 ppm		Daminozide si nécessaire		
Semaine 5	5,2 à 5,8	1,0 à 1,2	18 ° à 20 °C	Engrais 100 ppm à 150 ppm	Facultatif	Daminozide si nécessaire		

Pour des informations supplémentaires sur la culture technique:

OMBRE™ [CLIQUEZ ICI](#)



 **DANZIGER**

www.danzigeronline.com |   

OMBRE™

Calibrachoa hybrida



CONSEILS DE FINITION

- Pincement facultative
- Finition à basse température pour une meilleure qualité

Temps moyen (à partir de plantules)	Température	Retaille/ Modification de la longueur du jour	Fertilisation	Régulateur de croissance
7 à 8 semaines	Temps moyen	Pas de Pincement nécessaire	100 - 150 ppm N	En plantules et aux stades finaux
12 cm pot	18 ° - 20 °C			
8 à 9 semaines	18 ° - 20 °C	Pas d'éclairage nécessaire	EC du sol 1,0 - 1,2 pH 5,5 à 6,0	
15 cm				
8 à 9 semaines				
20 cm	3 plantes par récipient			
8 à 9 semaines				
25 cm	3 plantes par récipient			



- Du fer (Fe) ou du manganèse (Mn)supplémentaires peuvent être nécessaires en fonction de la qualité et de l'alcalinité de l'eau.
- Dépistage régulier des thrips

Finitions	pH	EC	Temp	Engrais	Eclairag e	PGR	Fongicide	Commentaires
Semaine 6 Transplant ation	5,6 à 6,0	1,0 à 1,2	18 ° à 20 °C	engrais 100 jusqu'à 150 ppm	Jour Neutre	Daminozide si nécessaire	Pulvériser un fongicide après transplantatio n	
Semaine 6 à 12	5,6 à 6,0	1,0 à 1,2	18 ° à 20 °C	engrais 100 jusqu'à 150 ppm	Pas nécessair e	Paclobutrazo Arroser de 1 à 2 ppm		Paclobutrazol 1 à 2 ppm arroser lorsque les plantes ont atteint 85% de la taille désirée

Pour des informations supplémentaires sur la culture technique:

OMBRE™ [CLIQUEZ ICI](#)



OMBRE™

Calibrachoa hybrida



OMBRE™ Pink - Photos d'essais à travers l'Amérique du Nord 2020



Mast Young Plants (MI)



Head Start Nursery (CA)



Metrolina Greenhouses (NC)

Pour des informations supplémentaires sur la culture technique:

OMBRE™ [CLIQUEZ ICI](#)



 **DANZIGER**
www.danzigeronline.com |   

OMBRE™

Calibrachoa hybrida



OMBRE™ Blue - Photos d'essais à travers l'Amérique du Nord 2020



Mast Young Plants (MI)



Head Start Nursery (CA)



Metrolina Greenhouses (NC)

Pour des informations supplémentaires sur la culture technique:

OMBRE™ [CLIQUEZ ICI](#)



 **DANZIGER**
www.danzigeronline.com |   