

TOUCH™

Scaevola aemula



TOUCH™
Indigo



- Die White Touch™-Sorte bleibt rein weiß auch bei niedrigen Temperaturen
- White Touch™ und Blue Touch™ eignen sich hervorragend für Körbchen und Kombinationen
- Die Höhe und Breite der reifen Pflanze beträgt 30 cm x 20 cm

Weitere Sorten in der TOUCH™-Kollektion:



TOUCH™
Blue



TOUCH™
White



TOUCH™
Baby Pink

Für zusätzliche technische
Information über Wachstum:

TOUCH™ [HIER KLICKEN](#)



 **DANZIGER**

www.danzigeronline.com |



TOUCH™

Scaevola aemula



BEWURZELUNGSTIPS

- Steckpriorität – 4 von 4



Blütezeit



Breite



Höhe

Frühjahr / Sommer
Blüte

25 - 41 cm

20 - 25 cm

Durchschnittszeit	Temperatur	Hormone	Düngung	Fungizid
5 Wochen	1. - 2. Woche 21 ° - 22 °C	Empfohlen	1. - 2. Woche 50 ppm N	Zur Kontrolle von Botrytis und Bakterien Fungizid am Stecktag spritzen
	3. - 5. Woche 20 ° - 21 °C		3. - 5. Woche 100 bis 150 ppm N	Breitband verwenden Woche 2



Bewässerungseinleitung - Möglichst bald vom Sprühnebel entfernen
Erde soll nicht Obermäßig mit Sprühnebel gespritzt oder gesättigt werden -
Adjuvant-Spray am Stecktag



- Warme Temperatur muss gewährleistet werden, damit die Pflanzen sich entwickeln und blühen können.
- Daminozid-Spray 2000 bis 2500 ppm nach Bedarf
- Stutzen in Woche 4 oder bei Topfen empfohlen

Bewurzelung	pH	EC	Temp	Düngung	Licht	Hemmstoff	Fungizid	Anmerkungen
Woche 1	5,8 / 6,2	0,80	22 / 23 °C	50 ppm N im Sprühnebel	Nicht notwendig		Stecktag	
Woche 2	5,8 bis 6,2	0,80 bis 0,90	22 / 23 °C	50 ppm N im Sprühnebel	Nicht notwendig		Zweite Fungizidanwendung	
Woche 3	5,8 bis 6,2	0,90 bis 1,0	22 / 23 °C	Düngung 100 ppm bis 150 ppm	Nicht notwendig			
Woche 4	5,8 bis 6,2	1,0 bis 1,2		Düngung 100 bis 150 ppm	Nicht notwendig			
Woche 5	5,8 bis 6,2	1,0 bis 1,2		Düngung 100 bis 150 ppm	Nicht notwendig	Daminozid nach Bedarf		Daminozid 2000 bis 2500 ppm

Für zusätzliche technische
Information über Wachstum:

TOUCH™ [HIER KLICKEN](#)



 **DANZIGER**

www.danzigeronline.com |



TOUCH™

Scaevola aemula



HINWEISE FÜR FERTIGSTELLUNG

- Temperaturen mäßig warm halten, um den Pflanzen die weitere Entwicklung zu ermöglichen (mittlere Tagestemperatur 20 bis 21 °C)

Durchschnittszeit (ab Jungpflanze)	Temperatur	Stutzen / Anpassung d. Tageslänge	Düngung	Hemmstoff
6 bis 7 Wochen	Durchschnittszeit	Stutzen - ja	150 - 200 ppm N	Daminozid-Spray 2500 bis 3750 ppm
12 cm Topf	20 ° - 21 °C	Nächtliche Unterbrechung oder verlängerter Tag - optional	Substrat EC 1,0 - 1,2 pH 5,8 bis 6,2	Mit 1 bis 2 ppm Paclobutrazol abgießen
8 bis 9 Wochen				
15 cm				
8 bis 9 Wochen				
20 cm	3 Pflanzen pro Topf			

Pflanzenschädlinge	Krankheiten
Blattläuse	ACETAMIPRID, FLONICAMID, IMIDACLOPRID, DICHLORVOS
Thrips	METHIOCARB, ACRINATHRIN, ABAMECTIN, DICHLORVOS, SPINOSAD
Botrytis	CYPRODINIL+FLUDIOXONIL, IPRODIONE, POLYOXIN
Pythium	PROPAMOCARB
Phytophthora	PROPAMOCARB



- PGR - Daminozid-Spray 2500 bis 3750 ppm zur Fertigstellung der Pflanzen
- Paclobutrazoldurchnässung 1 to 2 ppm kann falls nötig für Fertigstellung angewandt werden.
- Spray: Breitbandfungizid nach Transplantation
- Nach Blattläusen und Thrips muss regelmäßig untersucht werden

Fertigstellung	pH	EC	Temp	Düngung	Licht	Hemmstoff	Fungizid	Anmerkungen
Topfen Woche 5	5,8 bis 6,2	1,0 bis 1,2	18 bis 20 °C	Düngung 100 bis 150 ppm		B-9 nach Bedarf	Nach Topfen Fungizid spritzen	Daminozid-Spray 2500 bis 3750 ppm
Woche 6 bis 13	5,8 bis 6,2	1,0 bis 1,2	18 bis 20 °C	Düngung 100 bis 150 ppm		Mit Paclobutrazol nach Bedarf durchtränken		Mit 1 bis 2 ppm Paclobutrazol abgießen

Für zusätzliche technische Information über Wachstum:

TOUCH™ [HIER KLICKEN](#)

